

El quiròfan en un centre dental

Tal com hem dit en altres articles, la implantologia dental és una especialitat amb més de trenta anys d'existència. Una implantació dental és un dispositiu mecànic que es col·loca a l'interior de l'os maxil·lar per reemplaçar una dent o un queixal perduts.

La col·locació d'una tal implantació requereix una correcta tècnica quirúrgica, després d'un extens i profund estudi del cas, que ha de realitzar-se dintre dels nivells d'asèpsia i esterilització adequats.

Les mesures d'higiene i desinfecció que s'empren actualment a les clíniques dentals són les dictades per la normativa vigent. Els procediments de rentat, desinfecció, esterilització i conservació s'apliquen a instrumental, equips, mobiliari i roba del personal. Amb això s'evita qualsevol tipus de contagi, allò que s'anomena infecció creuada. Es protegeix la salut del pacient així com la del personal de la clínica.

Però: és coherent que en el mateix gabinet dental en el que s'han pres uns motlles, s'han col·locat sàvies obturacions i s'han realitzat algunes higiènes, en el mateix dia es faci una cirurgia de col·locació d'implantacions? Encara que se segueixin els protocols de desinfecció - tant a les superfícies com al terra - en la cadira dental i també en l'ambient poden quedar pols, gases o partícules contaminants que poden jugar en contra del procés quirúrgic a efectuar.

L'ideal és col·locar les implantacions en un quiròfan dissenyat a tal objecte, tota vegada que s'hi pot aconseguir asèpsia - absència de gèrmens infecciosos - perquè en tractar-se d'un espai quirúrgic d'ús limitat, és impossible que es contaminin



amb el que es produeix en fer altres tractaments dentals rutinaris sèptics.

Els futurs centres dentals - clíniques dentals de més d'un gabinet - hauran de comptar amb l'esmentat espai quirúrgic per tal de poder garantir al pacient els mitjans quirúrgics antisèptics necessaris per a la cirurgia de col·locació, aforament, farciment ossi, empelts ossis, etc. que sorgeixen en la planificació d'un cas d'implantacions dentals enfocat amb serietat professional.

És bo de recordar que el pacient d'edat avançada, les condicions anatòmiques del qual i de l'estat general de la seva


salut solen ésser delicats, és el que més sol·licita reemplaçar les seves peces dentals perdudes. Tota vegada que el seu sistema de defensa natural sol ésser baix, les mesures d'esterilització i asèpsia en intervencions quirúrgiques, fins i tot en les més senzilles, han d'ésser controlades rigorosament.

Si a cap cirurgia se li ocorreria operar un pacient a la mateixa sala i sobre la mateixa llitera en la qual passa visita cada dia: per què, col·locar unes implantacions dintre de l'os, mereixen menys?.

Per acabar, voldria recordar-vos que el nivell de rebuig d'una implantació és mínim, tota vegada que l'èxit d'aquestes intervencions supera el 90% dels casos. Una implantació pot fracassar per problemes de salut general - sinusitis, diabetis, etc. - per pròtesis inadequades, o per falta de vigilància higiènica per part del pacient. Un pacient amb implantacions ha de tenir una higiene bucal exquisida i controlar-se cada sis mesos amb el seu implantòleg, encara que no tingui cap simptomatologia. Si el pacient no es neteja correctament, pot patir un procés similar a la piòrrea de les dents, que en les implantacions s'anomena periimplantitis.

Tal com diem sempre, les implantacions dentals no són la panacea mèdica bucal. S'han de tenir en compte una sèrie de factors - salut general, tipus d'os, qualitat de l'os, asèpsia quirúrgica, higiene bucal correcta, etc. - per tal que el tractament tingui èxit.

Dr. Manuel López de Calatayud
Llicenciat en Odontologia - COEC
núm. 3800



Clínica Dental ReyTo

Clínica dental associada a I.S.O.
Col·laboradora Fer dental
Adherida a la Unió de Botiguers
i Comerciants de Cassà

Consulta telefònica 972 46 18 13
C/ Baixada de la piscina, 6
CASSÀ DE LA SELVA (GIRONA)

- Odontologia general
- Implantacions dentals:
 - Tradicionals
 - Immediates
- Laboratoris de pròtesi
- Estètica dental
- Odontopediatria